Tabla General de Características de Forrajeras de Invierno

Especie	Variedad	SUELOS Textura	Profundidad	Drenaje	Fertilidad	Densidad siembra Pura	Asociado	Fecha Siembra	Método Siembra	Duración planta	Resiembra	Riesgo Meteorismo	Observaciones	Meses en que la pastura instalada aporta forraje (**) Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Gramíneas						kg/há	kg/há			años															
Raigrás anual	LE 284	M a P	M a P	R a B	M a A	20 a 25	12 a 15	Feb a May	Cob, Con	1	A	-	2 n, Westerwold												
Raigrás anual	Rustmaster	M a P	M a P	R a B	M a A	20 a 25	12 a 15	Feb a May	Cob, Con	1	A	-	2 n, Westerwold												
Raigrás anual	Perfect FIT	M a P	M a P	R a B	M a A	20 a 25	12 a 15	Feb a May	Cob, Con	1	A	-	2 n, Westerwold												
Raigrás anual	Tetrawest	M a P	M a P	R a B	M a A	20 a 25	12 a 15	Feb a May	Cob, Con	1	A	-	4 n, Westerwold												
Raigrás anual	Baqueano	M a P	M a P	R a B	M a A	20 a 25	12 a 15	Feb a May	Cob, Con	1	M	-	4 n, Westerwold												
Avena sativa	Cristal	M a P	M a P	M a B	M a A	100 a 120	80	Mar a May	Con	1	-	-													
Avena sativa	Estero 2062	M a P	M a P	M a B	M a A	100 a 120	80	Mar a May	Con	1	-	-													
Avena byzantina	1095 a	M a P	M a P	M a B	M a A	100 a 120	80	Feb a May	Con	1	-	-													
Avena byzantina	Esterina	M a P	M a P	M a B	M a A	100 a 120	80	Feb a May	Con	1	-	-													
Avena strigosa	Esterosa	L a P	M a P	M a B	B a A	60 a 70	50 a 60	Mar a May	Con	1	-	-	Muy precoz												
Trigo forrajero	Pronta Puntal	L a P	M a P	M a B	B a A	100 a 120	100	Mar a May	Con	1	-	-	Doble propósito												
Cebada	Goldie	L a P	M a P	M a B	B a A	100 a 120	100	Mar a May	Con	1	-	-	Doble propósito												
Raigrás híbrido	Tetralite	M a P	M a P	R a B	M a A	20 a 25	12 a 15	Feb a May	Con	2 a 3	M	-	4 n, Italiano												
Festulolium	Lofa	M a P	M a P	B	M a A	20 a 25	12 a 15	Mar a May	Con	2 a 3	-	-													
Cebadilla	Ñandú	M a P	M a P	B	A	30 a 35	15 a 20	Feb a May	Con	2 a 3	M	-													
Cebadilla	Copetona	M a P	M a P	B	A	30 a 35	15 a 20	Feb a May	Con	2 a 3	M	-													
Holcus	La Magnolia	L a P	S a P	M a B	B a M	10 a 12	4 a 6	Mar a May	Cob, Con	4 a 3	M	-													
Festuca	Martin II	L a P	M a P	P a B	M a A	15 a 20	8 a 12	Mar a May	Con	4 o +	-	-	Med/Continental												
Festuca	Feline	L a P	M a P	P a B	M a A	15 a 20	8 a 12	Mar a May	Con	4 o +	-	-	Tipo Mediterráneo												
Festuca	Tacuabé	L a P	M a P	P a B	M a A	15 a 20	8 a 12	Mar a May	Con	4 o +	-	-													
Festulolium	Hykor	L a P	M a P	P a B	M a A	15 a 20	8 a 12	Mar a May	Con	4 o +	-	-	Tipo Festuca												
Dactilis	Athos	L a M	M a P	B	M a A	10 a 12	6 a 8	Mar a May	Con	3 a 4	-	-													
Dactilis	Porto	L a M	M a P	B	M a A	10 a 12	6 a 8	Mar a May	Con	3 a 4	-	-													
Dactilis	Amba	L a M	M a P	B	M a A	10 a 12	6 a 8	Mar a May	Con	3 a 4	-	-													
Leguminosas																									
Trebol Alejandrino	Pharaon	M a P	M a P	M a B	M a A	15 a 20	8 a 10	Mar a May	Con	1	No	B													
Lotus subbiflorus	El Rincón	L a P	S a P	P a B	B a M	6 a 8	-	Mar a May	Cob	1	MA	-													
Trébol Rojo	LE 116	M a P	M a P	R a B	M a A	10 a 12	6 a 8	Mar a May	Con	2 a 3	B	MA													
Trébol Rojo	Quiñequelli	M a P	M a P	R a B	M a A	10 a 12	6 a 8	Mar a May	Con	2 a 3	B	MA													
Trébol Rojo	Tropero	M a P	M a P	R a B	M a A	10 a 12	6 a 8	Mar a May	Con	2 a 3	B	MA													
Trébol Blanco	Zapicán	M a P	M a P	P a B	M a A	5 a 6	2 a 3	Mar a May	Cob, Con	3 o +	M	A													
Trébol Blanco	Super Haifa	M a P	M a P	P a B	M a A	5 a 6	2 a 3	Mar a May	Cob, Con	3 o +	M	A													
Lotus corniculatus	San Gabriel	L a P	S a P	R a B	B a A	12 a15	8 a 10	Mar a May	Cob, Con	3 o +	A	-													
Lotus tenuis	Chajá	M a P	M a P	P a M	B a A	10 a 12	8 a 10	Mar a May	Cob, Con	3 o +	A	-													
Lotus pedunculatus	Maku	M a P	M a P	R a B	M a A	6 a 8 (*)	-	Mar a May	Cob, Con	4 o +	A	-													
Alfalfa	Chaná	M a P	P	MB	A	18 a 20	10 a 12	Mar a Ago	Con	3 a 4	-	MA													
Alfalfa	Araucana	M a P	P	MB	A	18 a 20	10 a 12	Mar a Ago	Con	3 a 4	-	MA													
Otros																									
Achicoria	Salad A	L a P	M a P	M a B	M a A	10	4 a 6	Mar a Ago	Con	2 a 3	A	-													

		Liviano	Superficial	Pobre	Baja				Cobertura		Muy Baja	Bajo													
		Medio	Medio	Regular	Media				Convencional		Baja	Alto													
		Pesado	Profundo	Medio	Alta						Media	Muy alto													
				Bueno							Alta														
				Muy bueno																					

(*) por el alto costo de la semilla, normalemente se usan 2 a 3 kg./há