

ATHOS

Nueva información nacional: año 2008.

El Dactilis es una especie perenne invernada que forma un tapiz abierto de matas individuales. No produce rizomas ni estolones, lo que lo hace poco agresivo con las especies que lo acompañan en la pastura. Soporta bien la sombra, lo que también lo hace indicado para siembras asociadas. Tiene un sistema radicular superficial, por lo que no se adapta bien a suelos de mal drenaje, y al no tener raíces profundas tampoco soporta sequías muy prolongadas.

Aunque responde muy bien a fertilidad, crece bien en suelos de fertilidad media, aun livianos. Dentro de los problemas de la especie está la susceptibilidad a *Colletotrichum graminis*.

ATHOS es cultivar de floración muy tardía a diferencia de Amba que es de floración temprana e INIA LE Oberón que es de floración intermedia. Esta característica le permite un mes más de producción de forraje de alta calidad, a la vez que competir mejor con la gramilla. Supera a Amba y e iguala o supera a INIA LE Oberón en producción de forraje.

ATHOS es superior a INIA LE Oberón en resistencia a *Colletotrichum*, el principal problema sanitario de la especie y también es mejor su comportamiento frente a roya de la hoja.

NUEVA INFORMACION NACIONAL OFICIAL:

Cuadro 28: Producción estacional y acumulada de de forraje. INIA La Estanzuela año 2008.

Cultivares	Corte 1	Corte 2	Corte 3	Total	%
Festuca Tacuabé	112	109	94	5.142	107
ATHOS	123	88	90	4.953	103
INIA LE Oberón	100	100	100	4.819	100
Grassly	99	92	93	4.571	95
Porto	86	80	91	4.083	85
Amba	97	70	76	3.964	82

INIA 2009

ATHOS confirma nuevamente su comportamiento excelente, **algo superior a INIA LE Oberón**, y se despega de los tradicionales Porto y Amba, a los cuales saca 20 % de ventaja.

Cuadro 34: Comportamiento sanitario. Año 2008 INIA La Estanzuela.

Cultivares	Manchas Foliares (<i>Colletotrichum</i> sp y <i>Bipolaris</i> sp)	Roya de la hoja (<i>Puccinia</i> sp)
ATHOS	2 %	0 %
INIA LE Oberón	5 %	5 %

INIA 2009